磁固相萃取-气相色谱-火焰光度检测联用 测定果汁中的有机磷农药

黄 倩, 何 蔓, 陈贝贝, 胡 斌*

(武汉大学化学与分子科学学院, 生物医学分析化学教育部重点实验室, 湖北 武汉 430072)

摘要:制备了苯乙烯(St)和甲基丙烯酸(MAA)共聚物改性的磁性微球 $\text{Fe}_3\text{O}_4@P(\text{St-co-MAA})$, 并将其作为磁固相萃取吸附剂, 建立了磁固相萃取(MSPE)-气相色谱(GC)-火焰光度检测(FPD)联用分析有机磷农药(OPPs)残留的新方法。以 5 种有机磷农药(二嗪农、甲基毒死蜱、杀螟硫磷、毒死蜱和啉硫磷)为目标分析物, 考察并优化了吸附和解吸条件, 确定了最佳实验条件。在最优的实验条件下, 方法对 5 种 OPPs 的检出限($S/N=3$)为 $0.013 \sim 0.305 \mu\text{g/L}$, 方法的相对标准偏差(RSD, $n=7$)为 $3.1\% \sim 8.8\%$, 富集倍数为 $406 \sim 951$, 线性范围达 3 个数量级。将该方法应用于新鲜番茄汁、草莓汁样品中的 OPPs 残留分析, 加标回收率为 $85.4\% \sim 118.9\%$ 。该方法具有检出限低、分析速度快、富集倍数高等优点, 为有机磷农药的残留分析提供了新的技术平台。

关键词:磁固相萃取; 气相色谱-火焰光度检测; 有机磷农药; 果汁

中图分类号: O658

文献标识码: A

文章编号: 1000-8713(2014)10-1131-07

Magnetic solid phase extraction combined with gas chromatography-flame photometric detection for the determination of organophosphorus pesticides in juice samples

HUANG Qian, HE Man, CHEN Beibei, HU Bin*

(Key Laboratory of Analytical Chemistry for Biology and Medicine (Ministry of Education),
College of Chemistry and Molecular Sciences, Wuhan University, Wuhan 430072, China)

Abstract: A novel method for the determination of organophosphorous pesticides (OPPs) in fresh juice samples was developed. $\text{Fe}_3\text{O}_4@P(\text{St-co-MAA})$ magnetic microparticles were synthesized and modified with styrene (St) and methacrylic acid (MAA) by coating St and MAA on magnetic particles and characterized by a series of techniques. The results indicated that Fe_3O_4 magnetic nanoparticles (MNPs) have been successfully modified with St and MAA. Based on the prepared $\text{Fe}_3\text{O}_4@P(\text{St-co-MAA})$ magnetic microparticles, a novel method of magnetic solid phase extraction (MSPE)-gas chromatography (GC)-flame photometric detection (FPD) was developed for the determination of OPPs. The extraction/desorption conditions of MSPE were optimized, and the analytical performance was evaluated under the optimal conditions. The limits of detection (LODs, $S/N=3$) for target OPPs were in the range of $0.013 \sim 0.305 \mu\text{g/L}$ with the RSDs ($n=7$) ranging from 3.1% to 8.8% . The enrichment factors varied from 406 to 951. The linear ranges were over three orders of magnitudes ($R^2 > 0.99$) and the reproducibilities were $7.4\% \sim 14.5\%$ ($n=5$). Finally, the proposed MSPE-GC-FPD method was successfully applied to the analysis of the five OPPs in fresh tomato and strawberry juice samples, with the recoveries of target OPPs in the range of $85.4\% \sim 118.9\%$ for the spiked samples. The proposed MSPE-GC-FPD method is featured with low cost, fast separation and high enrichment factor.

Key words: magnetic solid phase extraction (MSPE); gas chromatography-flame photometric detection (GC-FPD); organophosphorus pesticides (OPPs); juices

* 通讯联系人. Tel: (027) 87218764, E-mail: binhu@whu.edu.cn.

基金项目: 国家自然科学基金项目(20975076).

收稿日期: 2014-07-18

有机磷 (OPPs) 农药在食品中的浓度通常很低,且样品基体成分复杂,因此很多样品不能直接进样分析,往往需要在样品色谱分离检测前,辅以合适的样品前处理技术以消除干扰、降低检出限。用于农药残留分析的样品前处理技术有很多,包括液液萃取^[1]、固相萃取^[2,3]、液相微萃取^[4]、固相微萃取^[5,6]、超临界流体萃取^[7]、QuEChERS^[8]、搅拌棒吸附萃取^[9]、磁固相萃取 (MSPE)^[10,11] 等。其中,MSPE 具有材料制备简单、磁性材料表面易于改性、在溶液中分散性好、传质速度快、分离迅速、操作简单、材料可重复利用等优势^[12,13]。2012 年, Eskandari 等^[10] 合成了苯乙烯改性的磁性纳米材料 $\text{Fe}_3\text{O}_4@ \text{PS}$ 用于富集检测水样、尿样、血浆和土壤样品中的杀螟松;但该方法采用紫外检测器检测,检出限为 $0.5 \mu\text{g/L}$,而且解吸剂丙醇的用量达 1 mL ,其理论富集倍数仅为 45。Maddah 等^[11] 合成了十八烷基硅烷磁性纳米颗粒,用于分离富集环境水样中的二嗪农和杀螟松,用 HPLC-UV 分离检测,检出限分别为 0.019 和 $0.014 \mu\text{g/L}$,富集倍数分别达到 172 和 184。文献^[10] 的检出限过高,不满足欧盟饮用水标准 (单种有机磷农药不超过 $0.1 \mu\text{g/L}$,总有机磷农药含量不超过 $0.5 \mu\text{g/L}$);文献^[11] 不但材料合成反应时间长达 40 h 以上,且 HPLC 在 10 min 内仅能分离两种有机磷农药,耗时长。

本文的目的是将 MSPE 与气相色谱 (GC)-火焰光度检测 (FPD) 联用,建立新鲜果汁样品中痕量 OPPs 分析的方法。利用一步乳液聚合法在 Fe_3O_4 磁性纳米颗粒表面负载苯乙烯 (styrene, St) 和甲基丙烯酸 (methacrylic acid, MAA) 聚合物,得到磁性聚合物材料 $\text{Fe}_3\text{O}_4@ \text{P}(\text{St-co-MAA})$,并将其用于实际样品中 5 种 OPPs 的分析检测。

1 实验部分

1.1 仪器及主要工作条件

恒温加热磁力搅拌器 (DF-101S, 上海东玺制冷仪器设备公司), 电动搅拌机 (RW 20 Digital, 德国 IKA 公司)、真空干燥箱 (DZG-6020, 上海森信实验仪器厂) 用于磁性材料的制备。傅里叶红外光谱仪 (NEXUS 870, 美国 NICOLET 公司)、透射电镜 (JEOL JEM 2010(HT), 日本电子株式会社)、X 射线粉末衍射仪 (Bruker WXS D8 advance, 德国 Bruker 公司)、热重分析仪 (SETSYS 16TG/DAT/DSC, 法国 Setaram 公司) 以及振动样品磁强计 (VSM) (PPMS-9T, 美国 Quantum Design 公司) 用于磁性材料的表征。

数控超声波清洗器 (KQ5200DE, 昆山市超声仪器有限公司) 用于超声辅助萃取和洗脱目标分析物;钕铁硼永久性磁铁用于磁性材料的分离。

GC-FPD (Agilent 6890N), 检测器装磷型滤光片,所用色谱柱为 HP-5 型 ($30 \text{ m} \times 320 \mu\text{m} \times 0.25 \mu\text{m}$),固定相为 5% 苯基-95% 甲基-聚硅氧烷 (美国 Agilent 公司)。进样口及检测器温度为 $250 \text{ }^\circ\text{C}$ 。色谱柱升温程序:初始温度 $100 \text{ }^\circ\text{C}$,保持 1 min ; $30 \text{ }^\circ\text{C/min}$ 升至 $180 \text{ }^\circ\text{C}$,保持 1 min ; $10 \text{ }^\circ\text{C/min}$ 升至 $195 \text{ }^\circ\text{C}$,保持 2 min ; $20 \text{ }^\circ\text{C/min}$ 升至 $250 \text{ }^\circ\text{C}$ 。载气及补充气均为氮气,流速分别为 3.2 mL/min 和 60 mL/min ;氢气流速为 75 mL/min ;空气流速为 100 mL/min 。进样方式为脉冲不分流,进样量为 $5 \mu\text{L}$ 。

1.2 试剂及标准溶液

氯化铁 (FeCl_3 , 分析纯)、氨水 (NH_4OH , 分析纯)、甲基丙烯酸 ($\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_2$, 化学纯)、苯乙烯 (C_8H_8 , 化学纯)、十二烷基苯磺酸钠 ($\text{C}_{18}\text{H}_{29}\text{NaO}_3\text{S}$, 分析纯)、过硫酸铵 ($(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$, 分析纯) 购自上海国药集团化学试剂有限公司;氯化亚铁 (FeCl_2 , 分析纯) 购于阿拉丁试剂有限公司;二乙烯基苯 ($\text{C}_{10}\text{H}_{10}$, 化学纯) 购于天津光复精细化工研究所;乳化剂 OP-10 (壬基酚聚氧乙烯醚,纯度 99%,进口分装) 购自武汉市同心化工厂。实验中用到的溶剂 (无水乙醇、丙酮、甲苯、环己烷、乙酸乙酯、正己烷、氯仿) 均为分析纯,购自上海国药集团化学试剂有限公司。实验用水为二次蒸馏水。

有机磷农药标准品 (质量浓度均为 100 mg/L 的丙酮标准储备液,由农业部环境保护科研监测所 (天津) 提供): 二嗪农 (dazinon, GSB05-2291-2008)、甲基毒死蜱 (chlorpyrifos-methyl, GSB05-1870-2008)、杀螟硫磷 (finitrothion, GSB05-2287-2008)、毒死蜱 (chlorpyrifos, GSB05-1869-2008)、喹硫磷 (quinalphos, GSB05-2330-2008), 于 $4 \text{ }^\circ\text{C}$ 低温条件下保存。

1.3 $\text{Fe}_3\text{O}_4@ \text{P}(\text{St-co-MAA})$ 磁性材料的合成

首先采用共沉淀法合成 Fe_3O_4 磁性纳米颗粒^[14],然后参考文献^[14] 中的乳液聚合一步合成法制备 $\text{Fe}_3\text{O}_4@ \text{P}(\text{St-co-MAA})$ 磁性微球;在机械搅拌条件下向含有 0.485 g 十二烷基苯磺酸钠、 3.4 mL 乳化剂 OP-10 和 8 mL 水的三口烧瓶中依次加入 10 mL 苯乙烯、 $80 \mu\text{L}$ 二乙烯基苯,接着加入 4 g Fe_3O_4 磁性微球、 1.5 mL 甲基丙烯酸单体,最后加入 20 mg 过硫酸铵引发反应,在 $80 \text{ }^\circ\text{C}$ 下加热回流 12 h ,生成苯乙烯和甲基丙烯酸共聚物改性的 $\text{Fe}_3\text{O}_4@ \text{P}(\text{St-co-MAA})$ 磁性微球。反应完成后将产物转移至

250 mL 烧杯中,用 200 mL 2 mol/L 的 HCl 浸泡 2~3 h,溶解未被改性的 Fe_3O_4 磁性纳米颗粒。用水清洗材料,直至上清液澄清,再用乙醇洗涤 3 次,于 60 $^{\circ}\text{C}$ 条件下干燥过夜,磨细后直接用于后续萃取。

1.4 磁固相萃取过程

取 20 mL 样品溶液于玻璃烧杯(25 mL)中,加入 10 mg $\text{Fe}_3\text{O}_4@P(\text{St-co-MAA})$ 磁性微球,超声萃取 20 min。然后将钕铁硼磁铁置于烧杯外壁,磁性微球在磁场的作用下迅速移动至烧杯侧壁,弃掉样品溶液,将吸附目标分析物的磁性微球转移至 2 mL 离心管中。移开钕铁硼磁铁,将磁性微球重新分散在 20 μL 丙酮溶剂中,超声解吸 10 min 以洗脱吸附在 $\text{Fe}_3\text{O}_4@P(\text{St-co-MAA})$ 磁性微球上的有机磷农药。最后将 5 μL 洗脱液引入 GC-FPD 进行检测。

1.5 样品的采集与处理

将购于武汉本地市场的草莓、番茄分别用榨汁机榨汁,过滤,离心。取 5 mL(番茄汁:4.88 g、草莓汁:4.85 g)样品,分别加入一定量的有机磷农药混合标准溶液,制成加标果汁样品。考虑到样品基体

效应可能带来的干扰以及实际萃取过程中样品量需求较大,将得到的果汁稀释 100 倍,再进行上述磁固相萃取,萃取完成后注入 GC-FPD 进行检测。

2 结果与讨论

2.1 $\text{Fe}_3\text{O}_4@P(\text{St-co-MAA})$ 的表征

对所制备的材料进行了 X 射线衍射(XRD)表征。结果表明,对于所制备的 Fe_3O_4 磁性纳米颗粒和 $\text{Fe}_3\text{O}_4@P(\text{St-co-MAA})$ 磁性微球而言,在 2θ 分别为 30.2 $^{\circ}$ 、35.26 $^{\circ}$ 、43.24 $^{\circ}$ 、53.68 $^{\circ}$ 、57.4 $^{\circ}$ 、62.68 $^{\circ}$ 和 74.66 $^{\circ}$ 处均出现了 Fe_3O_4 的特征衍射峰,说明所合成材料的核结构为 Fe_3O_4 ,且改性前后晶体结构没有发生改变。分别采用扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)对 $\text{Fe}_3\text{O}_4@P(\text{St-co-MAA})$ 磁性微球进行表征(见图 1),结果表明,所制备的 $\text{Fe}_3\text{O}_4@P(\text{St-co-MAA})$ 颗粒是直径 3~5 μm 的微球;所制备的 Fe_3O_4 磁性纳米颗粒的粒径在 10 nm 左右, Fe_3O_4 磁性纳米颗粒均匀分布在聚合物微球内。说明聚合物成功改性了 Fe_3O_4 磁性纳米颗粒。

图 1 $\text{Fe}_3\text{O}_4@P(\text{St-co-MAA})$ 材料的(a)扫描电镜及(b)透射电镜表征

Fig. 1 Characterizations of $\text{Fe}_3\text{O}_4@P(\text{St-co-MAA})$ by (a) scanning electron microscope (SEM) and (b) transmission electron microscope (TEM)

与纯 Fe_3O_4 磁性纳米颗粒相比,在 $\text{Fe}_3\text{O}_4@P(\text{St-co-MAA})$ 磁性微球的红外谱图(略)上可以清晰地观察到羧基(1700.88 cm^{-1})、苯环(698、756 cm^{-1})的特征吸收峰;570 cm^{-1} 处出现 Fe_3O_4 的特征吸收峰,说明 St/MAA 通过聚合反应被成功地包裹到 Fe_3O_4 磁性纳米颗粒上。采用热重分析仪对所制备的 $\text{Fe}_3\text{O}_4@P(\text{St-co-MAA})$ 磁性微球的组分比例以及材料的耐高温情况进行了考察。结果表明,0~200 $^{\circ}\text{C}$ 内材料略有损失,可能缘于聚合材料中部分小分子或低聚物的挥发(苯乙烯的沸点为 145.2 $^{\circ}\text{C}$,甲基丙烯酸酸的沸点为 161 $^{\circ}\text{C}$);200 $^{\circ}\text{C}$ 以上,聚合物迅速分解;300 $^{\circ}\text{C}$ 以上,聚合物分解速度更快。组分的损失量说明 Fe_3O_4 表面包裹了约

12%(m/m)的聚合物;同时,该结果表明所制备的聚合物材料不适用于热解吸模式。

自制的 Fe_3O_4 磁性纳米颗粒和 $\text{Fe}_3\text{O}_4@P(\text{St-co-MAA})$ 磁性微球的 VSM 结果表明, Fe_3O_4 和 $\text{Fe}_3\text{O}_4@P(\text{St-co-MAA})$ 具有相似的曲线,在外加磁场为零时,材料的磁性迅速降为零,只在外加磁场作用下才表现出磁性,说明改性前后的材料都具有超顺磁性。 Fe_3O_4 磁性纳米颗粒的饱和磁化强度为 68.57 emu/g,与文献^[15]报道值接近,比 $\text{Fe}_3\text{O}_4@P(\text{St-co-MAA})$ 材料的饱和磁化强度(52.81 emu/g)略大。共聚反应得到的聚合物增加了 Fe_3O_4 表面涂层的厚度,降低了饱和磁化强度,但并没有影响材料超顺磁的性质。改性后的材料饱和磁化强度降

低,从侧面反映出 Fe_3O_4 磁性纳米颗粒被共聚物成功改性。文献报道饱和磁化强度大于 16.3 emu/g 的材料可被常见的磁铁分离^[16],因此本实验合成的 $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{P}(\text{St-co-MAA})$ 磁性微球适用于磁铁分离,可用于磁固相萃取。

另外,将自制的 $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{P}(\text{St-co-MAA})$ 磁性微球分别浸没于丙酮、乙醇、 0.1 mol/L HCl 、 1 mol/L HCl 、 0.1 mol/L NaOH 、 1 mol/L NaOH 中,于 24 h 后取出,经水清洗后在优化条件下进行萃取解吸,比较其萃取效率变化。结果表明,自制的磁性微球耐酸、耐碱及耐有机溶剂性能良好,说明该材料具有较好的化学稳定性。

2.2 磁固相萃取条件的优化

在 $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{P}(\text{St-co-MAA})$ 磁性聚合物材料磁固相萃取过程中,影响萃取效率的主要因素有样品体积、萃取时间、离子强度、解吸溶剂种类、洗脱剂体积、洗脱时间等。实验中分别对这些因素进行了详细的考察。

2.2.1 样品体积和萃取时间的影响

固定每种目标分析物的质量为 100 ng ,在 $1\sim 50 \text{ mL}$ 范围内,考察样品体积对 5 种目标分析物萃取效率的影响。结果表明,当样品体积在 $5\sim 20 \text{ mL}$ 范围内变化时,5 种目标分析物的萃取效率没有明显的变化(见图 2),为了尽量提高富集倍数,后续实验中选取样品体积为 20 mL 。

为了缩短样品处理时间,对样品超声萃取时间进行了优化。在 $5\sim 30 \text{ min}$ 范围内,考察了萃取时间对 5 种目标分析物萃取效率的影响。结果表明, 20 min 后萃取基本达到平衡(见图 3),考虑到分析速度,后续实验中选择萃取时间为 20 min 。

图 2 样品体积对有机磷农药萃取的影响
Fig. 2 Effect of sample volume on the extraction of the OPPs

Conditions: $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{P}(\text{St-co-MAA})$, 10 mg ; OPPs, 100 ng ; extraction/desorption time, 15 min ; acetone, $40 \text{ }\mu\text{L}$; room temperature; injection volume, $1 \text{ }\mu\text{L}$.

图 3 萃取时间对 5 种有机磷农药萃取的影响
Fig. 3 Effect of extraction time on the extraction of the five target OPPs

Conditions: $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{P}(\text{St-co-MAA})$, 10 mg ; sample volume, 20 mL ; OPPs, $5 \text{ }\mu\text{g/L}$; desorption time, 15 min ; acetone, $40 \text{ }\mu\text{L}$; room temperature; injection volume, $1 \text{ }\mu\text{L}$.

2.2.2 离子强度的影响

考察了 NaCl 的质量浓度在 $0\sim 250 \text{ g/L}$ 范围内对各目标分析物萃取效率的影响,结果如图 4 所示。当 NaCl 的质量浓度在 150 g/L 左右时,对 5 种目标分析物的萃取效率最高,原因可能是加入无机盐增大了介质的离子强度,使 OPPs 在水溶液中的溶解度降低,从而提高了萃取效率;但是盐浓度过高会使溶液黏度增加,影响传质,从而使 OPPs 萃取效率降低。当 NaCl 的质量浓度超过 150 g/L 时,目标分析物的萃取效率明显降低,因此在后续实验中,选择在样品溶液中加入 NaCl 的质量浓度为 150 g/L 。

图 4 盐含量对 5 种有机磷农药萃取的影响
Fig. 4 Effect of salt content on the extraction of the five target OPPs

Conditions: $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{P}(\text{St-co-MAA})$, 10 mg ; sample volume, 20 mL ; OPPs, $5 \text{ }\mu\text{g/L}$; extraction time, 20 min ; desorption time, 15 min ; acetone, $40 \text{ }\mu\text{L}$; room temperature; injection volume, $1 \text{ }\mu\text{L}$.

2.2.3 解吸条件的优化

由于 HP-5 色谱柱不能承受极性较大的溶剂,故选取极性小的 5 种有机溶剂,考察解吸溶剂对解吸效果的影响。采用超声辅助有机溶剂解吸,比较了甲苯、环己烷、乙酸乙酯、正己烷、丙酮对 5 种目标分析物的解吸效率。结果表明,丙酮对 5 种目标分析物的解吸效果最佳,其原因是有机磷农药在丙酮中的溶解度较大,因此选择解吸溶剂为丙酮。考察了超声、涡旋等不同方式解吸的影响。结果表明,超声效果略优于涡旋;另外,超声波频率(33 kHz、40 kHz)影响不大。因此在后续实验中选择解吸方式为超声,频率为 40 kHz。

为了缩短样品处理时间,对样品解吸时间进行了优化。在 5~20 min 范围内考察了对 5 种目标分析物萃取的影响。结果表明,解吸时间超过 8 min,萃取基本达到平衡,故选择解吸时间为 10 min。

为了降低目标分析物的检出限,在脉冲不分流模式下,选择进样体积为 5 μ L。由于解吸溶剂的体积会影响到解吸效率和方法的富集倍数,因此在 15~100 μ L 范围内,考察了解吸剂体积的影响,结果如图 5 所示。当洗脱剂体积为 15 μ L 时,所获得的有机磷农药信号值最大,但解吸液的获取相对麻烦,最后选择洗脱剂体积为 20 μ L。

为了考察材料的记忆效应,用 20 μ L 丙酮对材料进行多次解吸。结果表明,二次洗脱液的信号值仅为一次洗脱液信号值的 3% 左右;3 次洗脱后,除二嗪农外,解吸液中基本无其他目标分析物的信号。说明一次洗脱即解吸出大部分目标分析物,但材料仍存在一定的记忆效应。实验中每次萃取仅需 10 mg 材料,而一次合成的材料达 3 g 之多,因此所合成的磁材料均只使用一次。

2.3 分析性能

在最优的实验条件下,对方法的分析性能进行了评价,结果列于表1。配制0.05~100 μ g/L 范围

图 5 解吸溶剂的体积对 5 种有机磷农药萃取的影响
Fig. 5 Effect of the volume of acetone as desorbent on the extraction of the five target OPPs
Conditions: Fe₃O₄@P(St-co-MAA), 10 mg; sample volume, 20 mL; OPPs, 5 μ g/L; 15% NaCl; extraction time, 20 min; desorption time, 10 min; room temperature; injection volume, 5 μ L.

的系列 OPPs 标准溶液,考察了方法的线性范围。另外,表 2 列出了本方法与其他用于有机磷农药分离富集的分析方法的检出限,可以看出,与文献^[17-19]相比,本方法对目标分析物的检出限更低;文献^[20]中使用了灵敏度更高但更为昂贵的质谱检测器,方法检出限低于本工作;与文献^[9,21]相比,本工作富集倍数更大,由于采用了大体积进样,其方法灵敏度可以得到进一步的改善;文献^[10,11]同样采用 MSPE,但材料合成方法都比较复杂,前者合成周期长达 72 h,后者合成周期也在 40 h 以上;而本工作材料制备方法简单且合成周期短,目标分析物多,且检出限低于与紫外-可见吸收光谱联用方法。本方法简单快速,富集倍数高,由于采用磁固相萃取作为样品前处理手段,避免了过滤、离心等繁琐操作,同时可以进行批操作。本方法的灵敏度足以满足对蔬果样品中有机磷农药残留的分析。

表 1 MSPE-GC-FPD 检测 OPPs 的分析性能 Table 1 Analytical performance of MSPE-GC-FPD for OPPs						
OPPs	Linear range/ (μ g/L)	<i>r</i>	Enrichment factor	RSD * (<i>n</i> = 7) / %	Limit of detection (<i>S</i> / <i>N</i> = 3) / (μ g/L)	Preparation reproducibility (<i>n</i> = 5) / %
Diazinon	0.04–50	0.9989	572	3.1	0.013	14.5
Chlorpyrifos-methyl	0.4–40	0.9986	951	8.8	0.134	12.1
Fenitrothion	1–100	0.9994	459	7.4	0.305	14.4
Chlorpyrifos	0.1–100	0.9991	406	6.7	0.031	10.1
Quinalphos	0.8–80	0.9972	425	6.0	0.196	7.4

* Mass concentrations of the OPPs: diazinon, 0.2 μ g/L; chlorpyrifos-methyl, 2 μ g/L; fenitrothion, 4 μ g/L; chlorpyrifos, 0.4 μ g/L; quinalphos, 2 μ g/L.

表 2 本方法与其他用于有机磷农药分析方法的检出限比较
Table 2 Comparison of the LODs of the proposed work with other methods

Method	LODs/($\mu\text{g/L}$)					Ref.
	Diazinon	Chlorpyrifos-methyl	Fenitrothion	Chlorpyrifos	Quinalphos	
SDME-GC-FPD	—	—	0.350	—	0.3700	[17]
SDME-GC-FPD	1.2000	—	1.480	—	1.1500	[18]
SPME-GC-FPD	1.0000	—	4.000	5.0000	—	[19]
SPE-GC-MS	0.0009	—	—	0.0007	0.0005	[20]
SBSE-LVI-GC-FPD	—	—	0.017	—	0.0130	[21]
SBSE-LVI-GC-FPD	—	—	0.031	—	0.0160	[9]
MSPE-UV	—	—	0.500	—	—	[10]
MSPE-HPLC-UV	0.0190	—	0.014	—	—	[11]
MSPE-GC-FPD	0.013	0.134	0.305	0.031	0.196	this work

LVI: large volume injection.

2.4 样品分析

将新鲜番茄、草莓样品榨汁,过滤、离心后得到番茄汁、草莓汁,分别用水稀释 100 倍^[17,22,23],然后用所建立的方法对稀释后的样品进行分析。稀释后的番茄汁、草莓汁样品中均未检出这 5 种有机磷农药。为了验证该方法的准确性,对实际样品进行了加标回收实验,表 3 列出了番茄汁、草莓汁样品中各分析物的加标回收实验结果,该方法对番茄汁、草莓汁样品的加标回收率为 85.0%~119%。图 6 是本方

法对稀释 100 倍的草莓汁、番茄汁样品及加标样品检测的色谱图。

根据食品安全国家标准《食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2012)规定,本文中多数被考察的有机磷农药最大允许残留限量(MRL)均大于 100 $\mu\text{g/kg}$ 。由于该方法的灵敏度高,检出限低,即使样品稀释后测定也同样能够检测到低于 MRL 的 OPPs,所以该方法可用于蔬果样品中有机磷农药残留的检测。

表 3 草莓汁和番茄汁样品中 5 种 OPPs 的加标回收率($n=3$)
Table 3 Recoveries of the five OPPs spiked in strawberry juice and tomato juice samples ($n=3$)

Analyte	Spiked/ ($\mu\text{g/L}$)	Strawberry juice		Tomato juice	
		Found (mean $\pm$ SD)/($\mu\text{g/L}$)	Recovery/%	Found (mean $\pm$ SD)/($\mu\text{g/L}$)	Recovery/%
Diazinon	0	0	—	not quantified	—
	0.1	0.09 $\pm$ 0.01	90.0	0.09 $\pm$ 0.01	90
	0.5	0.50 $\pm$ 0.04	100	0.50 $\pm$ 0.029	100
	1	0.99 $\pm$ 0.08	99.0	1.01 $\pm$ 0.12	101
Chlorpyrifos-methyl	0	0	—	0	—
	1	1.08 $\pm$ 0.12	108	1.12 $\pm$ 0.06	112
	5	4.54 $\pm$ 0.67	90.9	4.32 $\pm$ 0.51	86.4
	10	9.08 $\pm$ 0.14	90.8	11.5 $\pm$ 1.2	115
Fenitrothion	0	0	—	0	—
	2	1.83 $\pm$ 0.20	91.5	1.97 $\pm$ 0.25	98.2
	10	9.04 $\pm$ 0.71	90.4	8.93 $\pm$ 1.75	89.3
	20	19.4 $\pm$ 1.3	96.9	23.8 $\pm$ 4.2	119
Chlorpyrifos	0	0	—	0	—
	0.2	0.20 $\pm$ 0.01	100	0.17 $\pm$ 0.01	85.0
	1	1.03 $\pm$ 0.11	103	1.04 $\pm$ 0.06	104
	2	1.98 $\pm$ 0.11	99.2	1.88 $\pm$ 0.10	94
Quinalphos	0	0	—	0	—
	1	1.02 $\pm$ 0.06	102	1.04 $\pm$ 0.05	104
	5	5.40 $\pm$ 0.64	108	5.10 $\pm$ 0.91	102
	10	10.9 $\pm$ 0.4	109	10.3 $\pm$ 1.5	103

图 6 草莓汁和番茄汁实际样品(稀释 100 倍)的 GC-FPD 谱图
Fig. 6 GC-FPD chromatograms of strawberry juice and tomato juice samples (100 times diluted)

a and c: unspiked samples; b and d: spiked with the five OPPs at 0.1 $\mu\text{g/L}$ diazinon, 1 $\mu\text{g/L}$ chlorpyrifos-methyl, 2 $\mu\text{g/L}$ fenitrothion, 0.2 $\mu\text{g/L}$ chlorpyrifos and 1 $\mu\text{g/L}$ quinalphos.

Peak identifications: 1. diazinon; 2. chlorpyrifos-methyl; 3. fenitrothion; 4. chlorpyrifos; 5. quinalphos.

3 结论

本工作通过乳液聚合反应制备了苯乙烯与甲基丙烯酸共聚物改性的磁性微球($\text{Fe}_3\text{O}_4 @ \text{P}(\text{St-co-MAA})$),材料具有制备简单、价廉易得、磁性强、耐酸碱/耐溶剂、分散性好等特点。基于 $\text{Fe}_3\text{O}_4 @ \text{P}(\text{St-co-MAA})$ 磁性微球建立了 MSPE-GC-FPD 联用于新鲜番茄汁、草莓汁样品中有机磷农药残留分析的方法。与其他方法相比,本方法具有材料价廉易得、检出限低、富集倍数高、分析速度快、可进行批操作等优点。

参考文献:

- [1] Jimenez J J, Bernal J L, Toribio L, et al. J Chromatogr A, 2002, 946: 247
- [2] Zhou T, Xiao X, Li G. Anal Chem, 2012, 84: 5816
- [3] Song W, Lin S S, Sun G D, et al. Chinese Journal of Chromatography (宋伟, 林姗姗, 孙广大, 等. 色谱), 2012, 30(3): 318
- [4] Xiong J, Hu B. J Chromatogr A, 2008, 1193: 7
- [5] Rodrigues F D, Mesquita P R R, de Oliveira L S, et al. Microchem J, 2011, 98: 56
- [6] Jiang S X, Feng J J. Chinese Journal of Chromatography (蒋生祥, 冯娟娟. 色谱), 2012, 30(3): 219
- [7] Rissato S R, Galhiane M S, Knoll F R, et al. J Chromatogr A, 2004, 1048: 153
- [8] Chen X S, Bian Z Y, Yang F, et al. Chinese Journal of Chromatography (陈晓水, 边照阳, 杨飞, 等. 色谱), 2013, 31(11): 1116
- [9] Yu C, Hu B. J Sep Sci, 2009, 32: 147
- [10] Eskandari H, Naderi-Darehshori A. Anal Chim Acta, 2012, 743: 137
- [11] Maddah B, Shamsi J. J Chromatogr A, 2012, 1256: 40
- [12] Ding L, Wang H. Chinese Journal of Chromatography (丁兰, 王慧. 色谱), 2013, 31(2): 93
- [13] Zhang G J, Zang X H, Zhou X, et al. Chinese Journal of Chromatography (张贵江, 臧晓欢, 周欣, 等. 色谱), 2013, 31(11): 1071
- [14] Chen B B, Hu B, He M, et al. J Anal At Spectrom, 2013, 28: 334
- [15] Luo Y B, Shi Z G, Gao Q, et al. J Chromatogr A, 2011, 1218: 1353
- [16] Ma Z Y, Guan Y P, Liu H Z. J Polym Sci Pol Chem, 2005, 43: 3433
- [17] Xiao Q, Hu B, Yu C, et al. Talanta, 2006, 69: 848
- [18] Zhao E, Han L, Jiang S, et al. J Chromatogr A, 2006, 1114: 269
- [19] Lopez F J, Pitarch E, Egea S, et al. Anal Chim Acta, 2001, 433: 217
- [20] Wan Ibrahim W A, Veloo K V, Sanagi M M. J Chromatogr A, 2012, 1229: 55
- [21] Hu C, He M, Chen B, et al. J Chromatogr A, 2013, 1275: 25
- [22] Simplicio A L, Boas L V. J Chromatogr A, 1999, 833: 35
- [23] Li B N. [MS Dissertation]. Shanghai: Shanghai Jiao Tong University (李贝妮. [硕士学位论文]. 上海: 上海交通大学), 2008